

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

DLP 24-7-69 958677

PUBLICATION PERIODIQUE

EDITION DE LA STATION DE BOURGOGNE

ABONNEMENT ANNUEL

ET FRANCHE-COMTÉ - 21, Route de Seurre - 21 BEAUNE - Tél. 5.17

CÔTE-D'OR - DOUBS - HAUTE-SAÔNE - JURA - SAÔNE-ET-LOIRE - TERRITOIRE DE BELFORT - YONNE - NIÈVRE

Deposé de recettes de la Direction Départementale de l'Agriculture - C.C.P. DIJON 3405.12 K.

25 F.

Supplément n° 2 au Bulletin n° 106 - JUILLET 1969

22 JUILLET 1969

VIGNE

VERS DE LA GRAPPE : Le deuxième vol a été tardif et important jusqu'à ce jour, en Beaujolais et Mâconnais. En Côte d'Or, Yonne, Jura, après une activité faible le vol est constaté un peu partout. Dans les climats où ces ravageurs provoquent des dégâts, appliquer un traitement insecticide du type curatif.

MILDIOU - OIDIUM : Dans les vignes où le mildiou s'est montré très actif jusqu'à maintenant, ajouter un anti-mildiou à la bouillie insecticide. L'adjonction d'un anti-oidium est recommandée.

ACARIOSE - ARAIGNEES ROUGES : Il est trop tôt pour traiter.

M.E. : Eviter de traiter par très forte chaleur.

ARBRES FRUITIERS

CARPOCAPSE - TAVELURES - OIDIUM : Renouveler les traitements en vue d'assurer une bonne protection. Respecter la législation en ce qui concerne l'emploi des produits avant récolte.

CERISIERS - ANTHRACNOSE : Les conditions climatiques de Juin ont été très favorables au développement de l'Anthracnose du cerisier (appelée aussi parfois Cylindrosporiose), maladie cryptogamique bien connue dans la région et qui se manifeste par l'apparition sur les feuilles des arbres attaqués de nombreuses petites taches circulaires pourpres ou violacées qui peuvent confluer pour former des plages rougeâtres à brunes.

Les spores blanchâtres sont souvent visibles à la face inférieure des feuilles surtout en période humide (cette caractéristique permet d'éviter les confusions avec des brûlures toujours possibles sur feuilles de cerisiers).

Contrairement à la maladie criblée (Corynéum), l'anthracnose ne provoque pas de trous dans le limbe. Dans le cas de forte attaque, les feuilles jaunissent, puis rougissent et tombent prématurément (c'est le cas cette année).

A l'égard de l'anthracnose, les traitements recommandés sont surtout préventifs et doivent être appliqués dès fin Mai, début Juin et au plus tard à l'apparition des premières taches. Plusieurs applications sont nécessaires en année pluvieuse. Divers fongicides de synthèse peuvent être utilisés, en particulier la Doguadine. Un traitement après la cueillette des cerises est souhaitable cette année en vue de retarder le plus possible le développement de la maladie et la chute des feuilles. Il sera renouvelé avec intérêt en cas de pluie.

CASSISSIERS

OIDIUM DU CASSISSIER : Un dernier traitement est préconisé après la récolte.

P. 273

PYRALE DU MAIS

Le vol a été tardif ; commencé à la fin de la première décade de Juillet, il est surtout important depuis le 15, jour d'ailleurs où les premières pontes ont été repérées.

Dans les zones habituellement contaminées, il est recommandé d'effectuer un traitement, au stade fin de cornet panicule mâle visible dans celui-ci, à l'aide de granulés à base de D.D.T., Heptachlore, Fenitrothion, à raison de 20 à 30 Kgs de produit commercial à l'hectare.

CULTURES LEGUMIERES

TEIGNE DU POIREAU : Il est conseillé de renouveler le traitement.

NOCTUELLES : Chaque année à cette époque, on assiste à des dégâts occasionnés sur choux et choux-fleurs par ces ravageurs qui sont faciles à détruire à l'état jeune mais très difficiles ensuite.

Effectuer préventivement des poudrages ou pulvérisations à l'aide de D.D.T. ou de Parathion.

Les Ingénieurs - Contrôleurs chargés
des Avertissements Agricoles.

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie - Inspecteur
de la Protection des Végétaux - Circonscription
phytosanitaire "BOURGOGNE & FRANCHE-COMTE" :

H. SOULIE.

Imprimerie de la Station "Bourgogne et Franche-Comté"

Le Directeur-Gérant : L. BOUYX.